

## SDD suspensie – Selectieve Darm Decontaminatie

U ondergaat binnenkort een darmoperatie. Hiervoor heeft uw arts SDD suspensie voorgeschreven. De reden hiervoor is om de kans op een infectie na de operatie te verminderen. Denk hierbij aan een infectie of abces aan de wond, abces in de buik, blaasontsteking of longontsteking.

SDD bestaat uit een drankje (suspensie) van verschillende antibiotica. Namelijk Tobramycinesulfaat en Colistinesulfaat.

Deze antibiotica is alleen werkzaam in de darm (selectief). Hierdoor worden de schadelijke bacteriën die in de darm aanwezig zijn uitgeschakeld.

De SDD wordt niet in de bloedbaan opgenomen.

Het is de bedoeling om 3 dagen voor de operatie te starten met het innemen van de SDD. U neemt 4 keer per dag 5 ml.

Hieronder een schema zodat u goed kan bijhouden wanneer u de drank moet innemen. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Datum	Tijd	Tijd	Tijd	Tijd
3 dagen voor de operatie Datum:.....	8.00 uur	12.00 uur	17.00 uur	22.00 uur
2 dagen voor de operatie Datum:.....	8.00 uur	12.00 uur	17.00 uur	22.00 uur
1 dag voor de operatie Datum:.....	8.00 uur	12.00 uur	17.00 uur	22.00 uur
Operatiedag Datum:.....	7.00 uur	x	x	x